

Posologías para: Relenza

RELENZA DISKHALER (20 INH)

Información sobre el medicamento para: RELENZA DISKHALER (20 INH)

Nombre genérico: NOMBRE De **INGREDIENTE:** ZANAMIVIR (zah-NAM-ih-veer)

Fabricante del medicamento: GLAXO SMITH KLINE

Indicaciones: USOS COMUNES: Esta medicina es un agente antiviral utilizado para tratar la gripe (influenza A y B) en pacientes de 7 años de edad y mayores que han presentado síntomas por un lapso no mayor a 2 días. Esta medicina también se utiliza para prevenir la gripe en pacientes de 5 años de edad y mayores o para tratar otros padecimientos según lo determine su médico.

Instrucciones de administración del medicamento: COMO USAR ESTA MEDICINA: Siga las instrucciones provistas por su médico con respecto al uso de esta medicina. ESTA MEDICINA INCLUYE UN FOLLETO DE INFORMACION PARA EL PACIENTE. Léalo cuidadosamente. Pregunte a su médico, enfermera o farmacéutico cualquier duda que usted tenga sobre esta medicina. Consulte a su farmacéutico si usted no está seguro de cómo utilizar este dispositivo. No perforo el empaque de la medicina sino hasta que esté listo para tomar una dosis. SI USTED TIENE ASMA U OTROS PROBLEMAS RESPIRATORIOS (tales como la enfermedad pulmonar crónica obstructiva) y debe utilizar una dosis de su inhalador broncodilatador al mismo tiempo que utiliza esta medicina, utilice el broncodilatador antes de utilizar esta medicina. CONSERVE ESTA MEDICINA a temperatura ambiente (entre 59 y 86 grados F / 15 y 30 grados C). CONTINUE UTILIZANDO ESTA MEDICINA DURANTE TODO EL CURSO DEL TRATAMIENTO, aún si usted se siente mejor en unos cuantos días. No omita ninguna dosis.

Precauciones: PRECAUCIONES: NO UTILICE ESTA MEDICINA si le ha provocado una reacción alérgica o si usted es alérgico a alguno de sus ingredientes, a la lactosa o a la proteína de la leche. CONSULTE A SU MEDICO DE INMEDIATO si usted presenta problemas respiratorios o pulmonares o un agravamiento de éstos, tales como jadeo, falta de respiración u otros indicios de broncoespasmos. SI USTED TIENE ASMA o una enfermedad pulmonar crónica obstructiva, cerciórese de llevar siempre consigo un inhalador broncodilatador de acción rápida para utilizarlo en caso de presentar un broncoespasmo mientras utiliza esta medicina. ESTA MEDICINA NO PREVIENE LA INFLUENZA. Esta medicina no previene el contagio de la influenza a otras personas. ESTA MEDICINA PUEDE INTERFERIR CON LA VACUNA NASAL CONTRA LA INFLUENZA (GRIPE). No utilice esta medicina si usted recibió la vacuna nasal contra la influenza (gripe) durante las ultimas 2 semanas, a menos de que su médico así lo indique. No reciba la vacuna nasal contra la influenza (gripe) durante un mínimo de 48 horas después de utilizar esta medicina, a menos de que su médico así lo indique. Consulte a su médico si usted recibirá o si recibió recientemente la vacuna nasal contra la influenza (gripe). SE RECOMIENDA TENER CUIDADO AL UTILIZAR ESTA MEDICINA EN LOS NIÑOS, ya que pueden ser más sensibles a sus efectos, especialmente la confusión, el comportamiento anormal y los ataques. PARA MUJERES: SI USTED PLANEA EMBARAZARSE, comente con su médico los beneficios y los riesgos de usar esta medicina durante el embarazo. SE DESCONOCE SI ESTA MEDICINA SE EXCRETA en la leche materna. SI USTED ESTA AMAMANTANDO O SI PLANEA HACERLO mientras está utilizando esta medicina, consulte a su médico o farmacéutico para comentar los posibles riesgos para el bebé.

Posibles reacciones adversas: EFECTOS SECUNDARIOS POSIBLES: NO SE HAN REPORTADO REACCIONES SECUNDARIAS COMUNES con el uso adecuado de esta medicina. CONSULTE DE INMEDIATO A SU MEDICO si usted presenta comportamiento anormal u otros cambios en el comportamiento, confusión, dificultad para tragar, alucinaciones, latidos irregulares del corazón, cambios en la mente o en el estado de ánimo, ataques, falta de respiración, tirantez en el pecho o la garganta o jadeo. Es poco probable que usted presente UNA REACCION ALERGICA con el uso de esta medicina. Sin embargo, obtenga atención médica de inmediato si esto sucede. Los síntomas de una reacción alérgica incluyen erupciones cutáneas, escozor, hinchazón, mareo o dificultad para respirar. Si usted presenta otras reacciones inusuales, consulte a su médico, enfermera o farmacéutico. Esta no es una lista completa de todas las reacciones secundarias que pudieran ocurrir. Si usted tiene alguna duda sobre las reacciones secundarias, consulte a su proveedor de servicios médicos. Llame a su médico para obtener información sobre las reacciones secundarias. Usted puede reportar las reacciones secundarias a la FDA al teléfono 1-800-FDA-1088.